

BLUEBERRY



Güney
Agripark

BLUEBERRY

BLUEBERRY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

- Organik maddece zengin ve asit toprakları sever.
- Saçak kök miktarı fazla olan yüzlek kök yapısına sahiptir.
- Toprak Ph'ı 3,7 nin altında ise dikim yapılamaz.
- Uygun ph değeri 4 - 5,2 arasındır. Optimum ph değeri 4,5 dir.
- Toprak ph'sı yüksek olduğunda Demir, Fosfor ve Çinko eksikliği ortaya çıkar.
- Dikim zamanlaması olarak ilk bahar önerilir.
- Arazi dikimlerinde sıra üzeri 120 cm sıralar arası 300 cm olup, bu mesafeler 150 x 300 cm'ye kadar çıkabilir.
- Verime yatma süresi 2 - 3 yıldır. (Toprak Dikimlerinde)
- Topraksız üretimde dikimi takip eden ilk yıl verim alınabilir.
- Topraksız üretimlerde sıra üstü 80 cm sıra arası 150 cm yapılabilir. 70 x 300 cm aralıklara kadar uygulamalar vardır.
- 1 da'a toprak dikimlerinde 250 - 300 bitki dikilebilirken topraksız üretim de bu sayı 500 adet olabilir.
- Toprağa dikimlerde ekonomik ömürleri 30 yılı aşabilmektedir.
- Yetiştiricilikte iyi sonuç alabilmek için sıkça fakat azar azar gübreleme yapılmalıdır.
- Blueberry aşırı gübrelemeden zarar görür. Hatta ölebilir. (EC hassasiyeti vardır).
- Kolay çözünen ve sıvı gübrelere karşı son derece hassastır.
- Azot kaynağı nitrat formunda olan gübreler asla verilmemelidir.
- Üre, kükürtle kaplanmış üre ve amonyum sülfat uygun olan gübrelerdir.
- Gübre bitki kök bölgesinden uzağa verilmelidir.
- Gübre seçiminde yapılacak yanlışlık fidan kaybına neden olur.
- İyi bir büyüme ve sürekli verim için büyüme periyodunca toprak neminin uygun seviyede tutulması gerekir.
- Blueberry kökleri yüzlek ve çoğunlukla saçak köklerden oluşur.
- Budama son baharda yapraklar dökülür dökülmez başlayabilir.
- Budama yeni sürgün oluşumu ve bol meyve için yapılır.
- Meyve çoğunlukla sürgün uçlarında oluşur. Budama bunun için çok önemlidir.
- Sonbahar budaması ilkbahar öncesi budamalara göre daha geç çiçek açar
- Son bahar budamaları ilk bahar geç donlarını riskini azaltır.
- Son bahar da budananlar aşırı kış soğuklarından zarar görebilir.
- Alçak yayılan toprağa yakın dallar kesilmeli, dik dallar ve sürgünler bırakılmalıdır. Orta kısımda kalan dallar yoğunsa zayıf ve daha yaşlı dallar alınarak orta kısım rahatlatılmalıdır.
- Gözler kabarmaya başlayınca veya çiçeklenme meydana geldiğinde asla budama yapılmaz.
- Blueberry meyveleri çeşide , budamada bırakılan odun tipine ve iklime bağlı olarak 4 – 12 haftada olgunlaşır.
- Pembe iken toplanan meyveler olgunlaşmaya devam eder.



ÇEŞİTLERİMİZ



JUBILEE

GÜNEY ORİJİNLİ BİR ÇEŞİT OLUP, SOĞUKLAMA İHTİYACI 400 – 500 SAATTİR. YÜKSEK SICAKLIK , KÖTÜ TOPRAK KOŞULLARI GİBİ ETKENLERE DAYANIKLI OLUP, BÜYÜMESİ İYİDİR. DİK VE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME EĞİLİMİ GÖSTERİR. MEYVELERİ ORTA İRİLİKTEDİR. HASAT DÖNEMİ MAYIS AYIDIR.

MISTY

GÜNEY ORİJİNLİ OLUP, YAKLAŞIK 300 SAAT SOĞUKLAMA İHTİYACI VARDIR. MAYIS AYINDA HASAT EDİLEBİLİR. YÜKSEK VERİMLİDİR. GÜÇLÜ BÜYÜR VE ERKENCİDİR. ORTA İRİLİKTE MEYVE YAPAR.



O' NEAL

GÜNEY ORİJİNLİ ÇEŞİTTİR. SOĞUKLAMA İHTİYACI 400 SAATTİR. YAYVAN VE GÜÇLÜ BİR GELİŞME GÖSTERİR VE ERKENCİDİR. MEYVELERİNİ İRİ YAPAR. NİSAN - MAYIS AYLARINDA HASAT EDİLEBİLİR. (SICAK BÖLGELERDE) HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLIDIR.



DUKE

KUZEY ORİJİNLİ BİR ÇEŞİTTİR. SOĞULAMA İHTİYACI ORTALAMA 800 - 1000 SAAT DİR. ORTA İRİLİKTE MEYVELERİ OLUP, ERKENCİDİR. GEÇ ÇİÇEKLENİR. DOLAYISIYLA İLK BAHAR DONLARINA KARŞI DAYANIKLIDIR. MAYIS SONU OLGUNLAŞIR. HASAT DÖNEMİ MAYIS HAZİRAN AYLARIDIR. ÇOK VERİMLİ BİR ÇEŞİT OLUP, GELİŞİMİ ORTA, YANAL VE GÜÇLÜDÜR.





PATRIOT

KUZEY ORİJİNLİ OLUP, SOĞUKLAMA İHTİYACI YAKLAŞIK 1000 SAATTİR. ERKENCİDİR. HAZİRAN TEMMUZ AYLARINDA HASAT EDİLEBİLİR. YANAL VE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME EĞİLİMİ VARDIR. DOLAYISIYLA DÜZENLİ BUDANMALIDIR.

BLUECROP

KUZEY ORİJİNLİ BİR ÇEŞİT OLUP, VERİMLİ VE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLIDIR. ERKEN ORTA MEVSİM OLGUNLAŞIR. ORTALAMA 800 - 1000 SAAT SOĞUKLAMA İHTİYACI VARDIR. KOLAY YETİŞEN BİR ÇEŞİT OLUP, OLDUKÇA VERİMLİDİR. DÜZENLİ BUDANMALIDIR. HAZİRAN AYINDA MEYVELER OLGUNLAŞIR. AÇIK MAVİ RENKLİ, İRİ VE ÇOK İYİ LEZZETE SAHİPTİR.



BRIGITTA

KUZEY ORİJİNLİ BİR BİTKİDİR. ORTALAMA SOĞUKLAMA İHTİYACI 800 - 1000 SAAT CİVARIDIR. ORTA GEÇCİ OLUP, DİK VE GÜÇLÜ BÜYÜR. MEYVELERİ İRİDİR . OLDUKÇA VERİMLİ OLUP, DİĞER ÇEŞİTLERLE DİKİLDİĞİNDE HEM MEYVE HEMDE MEYVE İRİLİĞİ ARTAR. TEMMUZ AĞUSTOS AYLARINDA HASAT EDİLEBİLİR.



BLUEGOLD

KUZEY ORİJİNLİ BİR ÇEŞİT OLUP, DOLAYISIYLA SOĞUĞA KARŞI DAYANIKLIDIR. SOĞUKLAMA İHTİYACI ORTALAMA 800 - 1000 SAATTİR. MEYVELERİ İRİ BÜYÜME ŞEKLİ DİKDİR. ORTA MEVSİM OLGUNLAŞIR. HASAT ZAMANI HAZİRAN TEMMUZ AYLARIDIR.





LEGACY

KUZEY ORİJİNLİ BİR ÇEŞİT OLUP, 800 – 1000 SAAT SOĞUKLAMA İHTİYACI VARDIR. DİK VE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME YAPISI VARDIR. AĞUSTOS - EYLÜL AYLARINDA HASAT EDİLEBİLİR. ORTA GEÇÇİ BİR ÇEŞİTTİR. MEYVELERİ ORTA İRİLİKTEDİR.

CHANDLER

KUZEY ORİJİNLİ BİR ÇEŞİT OLUP, SOĞUĞA KARŞI OLDUKÇA DAYANIKLIDIR. (-24 ; -26 DERECE) MEYVELERİ ÇOK İRİDİR. ORTA GEÇ DÖNEM OLGUNLAŞIR. HASAT DÖNEMİ AĞUSTOS – EYLÜL AYLARIDIR. HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLIDIR. BÜYÜME ŞEKLİ YANAL VE GÜÇLÜ OLUP, ORTALAMA 1000 + SAAT SOĞUKLAMA İHTİYACI VARDIR.



DARROW

KUZEY ORİJİNLİ BİR ÇEŞİT OLUP, 1000 + SAAT SOĞUKLAMA İHTİYACI VARDIR. GEÇÇİ BİR ÇEŞİTTİR. HASAT DÖNEMİ EYLÜL OLUP DİK VE GÜÇLÜ BÜYÜME ŞEKLİNE SAHIPTİR. MEYVELERİ ÇOK İRİDİR.



ELLIOT

KUZEY ORİJİNLİ BİR ÇEŞİT OLUP, 1000 + SAAT SOĞUKLAMA İHTİYACI VARDIR. 3 İLA 5 HAFTALIK BİR SÜREDE OLGUNLAŞIR. GEÇÇİ BİR ÇEŞİTTİR. HASAT DÖNEMİ AĞUSTOS - EYLÜL AYIDIR. İYİ BİR GELİŞME GÖSTERİR. DOLAYISI İLE YETERİNCE BUDANMALIDIR.



YENİ ÇEŞİTLERİMİZ

A1

A11

A81

A307

BA22

BA46

BA305

A1 : KUZEY ORJİNLİ OLUP, YAKLAŞIK SOĞUKLAMA İHTİYACI 600 SAATTİR.

A11 : KUZEY ORJİNLİ OLUP, YAKLAŞIK SOĞUKLAMA İHTİYACI 600 SAATTİR.

A81 : KUZEY ORJİNLİ OLUP, YAKLAŞIK SOĞUKLAMA İHTİYACI 600 SAATTİR.

A307 : GÜNEY ORJİNLİ OLUP, HER DEM YEŞİLDİR.

BA22 : GÜNEY ORJİNLİ OLUP, HER DEM YEŞİLDİR.

BA46 : GÜNEY ORJİNLİ OLUP, HER DEM YEŞİLDİR.

BA305 : GÜNEY ORJİNLİ OLUP, HER DEM YEŞİLDİR.

BU ÇEŞİTLER ŞİLİ MENŞEİLİ OLUP, MEYVE EBATLARI 20 - 25 MM.' DİR.

ÇOĞALTIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTE OLUP, YAKIN BİR ZAMANDA TİCARİ OLARAK SATIŞA GEÇİLECEKTİR.





BLUEBERRY HASAT DÖNEMLERİ TABLOSU

			NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
DÜŞÜK SOĞUTMA GÜNEYLİ ÇEŞİTLER	ERKENÇİ	O'NEAL						
		MISTY						
	ORTA ERKEN	JUBİLEE						
YÜKSEK SOĞUTMA KUZEYLİ ÇEŞİTLER	ERKENÇİ	DUKE						
		PATRIOT						
	ORTA ERKEN	BLUEGOLD						
		BLUECROP						
		CHANDLER						
	GEÇ	LEGACY						
		BRIGITTA						
		DARROW						
ELLIOT								

HASAT ZAMANLARI VE SÜRELERİ YER VE İKLİME GÖRE DEĞİŞEBİLMEKTEDİR.
FAKAT MEYVE PERİYOTLARI VE ÇEŞİT DİZİSİ AYNI KALMAKTADIR.



BLUEBERRY ÇEŞİT ÖZELLİKLERİ

ÇEŞİT	PATENT	SERTLİK	TAD	BİTKİ	VERİM	HASAT DÖNEMİ	MEYVE İRİLİĞİ	BÜYÜME ŞEKLİ
DUKE	PUBLIC	2	2	1	2	ÇOK ERKEN	ORTA	YAYGIN - GÜÇLÜ
BLUECROP	PUBLIC	0	3	2	2	ORTA	İRİ	DİK - GÜÇLÜ
BLUEGOLD	PUBLIC	2	2	2	2	ORTA	İRİ	DİK
LEGACY	PUBLIC	1	2	2	3	ORTA /GEÇ	ORTA	DİK - GÜÇLÜ
CHANDLER	PUBLIC	1	2	2	1	ORTA /GEÇ	ÇOK İRİ	YAYGIN - GÜÇLÜ
ELLIOT	PUBLIC	0	0	2	3	ÇOK GEÇ	ORTA	DİK - GÜÇLÜ
O'NEAL	PUBLIC	1	2	2	2	ERKEN	İRİ	YAYGIN - GÜÇLÜ
MISTY	PUBLIC	1	3	2	2	ERKEN	ORTA	GÜÇLÜ
JUBİLEE	PUBLIC	1	2	2	2	ORTA	ORTA	DİK - GÜÇLÜ
PATRIOT	PUBLIC	2	3	2	2	GEÇ	İRİ	YAYGIN - GÜÇLÜ
BRIGITTA	PUBLIC	1	2	3	3	GEÇ	İRİ	DİK - GÜÇLÜ
DARROW	PUBLIC	2	3	2	3	ORTA /GEÇ	ÇOK İRİ	DİK - GÜÇLÜ

ÜRÜN PUANLAMA: 1 = DÜŞÜK 3 = YÜKSEK

BU DEĞERLER ORTALAMA OLUP; YER, İKLİM, ÜRETİM ŞEKLİ V.S. GİBİ ETKENLERE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEBİLİR.

